

MEDICINE DA SOSPENDERE TEMPORANEAMENTE NELLE MALATTIE ACUTE

Quando lei non sta bene e ha questi sintomi:

- Vomito o diarrea (a meno che siano limitati e di breve durata)
- Febbre, sudorazione e brividi (a meno che siano limitati e di breve durata)

Quando Lei deve sottoporsi a procedure come;

- interventi chirurgici elettivi
- Interventi endovascolari con mezzo di contrasto (ad es. coronarografia)

Sospenda le terapie elencate qui sotto dal suo medico.

Riprenda le medicine quando sta meglio (dopo 24-48 ore in cui riesce a mangiare e bere normalmente).

In caso di dubbi contatti il suo medico.

Medicine da sospendere nei giorni di malattia

- ACE inibitori:** medicine il cui nome finisce con "pril" (ramipril, enalapril,...).
- Sartani:** medicine il cui nome finisce con "sartan" (losartan, irbesartan,...).
- SGLT2i:** medicine il cui nome finisce con "gliflozin" (empagliflozin, dapagliflozin,...)
- Diuretici:** per esempio, furosemide (lasix), igroton, ...
- Metformina:** una medicina prescritta ai diabetici.
- Antidolorifici:** per esempio ibuprofene, diclofenac, naprossene,...
- Aminoglicosidi:** antibiotici Amikacina, Gentamicina, Kanamicina, Neomicina, Plazomicina, Streptomicina. Tobramicina

Altri medicinali da sospendere:

- _____
- _____
- _____
- _____